

SUSPENSIÓN ÓTICA Y TÓPICA



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SUSPENSIÓN ÓTICA Y TÓPICA

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suspensión Ótica y Tópica

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:

Miconazol Nitrato.....23,0 mg

Prednisolona Acetato.....5,0 mg Polimixina B Sulfato.....5.000 UI

Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES DE USO

Trasimed® se indica en el tratamiento de otitis externas y dermatitis causadas por hongos, levaduras y bacterias Gram (-).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica.

DOSIS

En otitis:

- Limpiar el conducto auditivo externo, con un producto ceruminolítico y antiséptico.
- Instilar 5 gotas de **Trasimed®** en el conducto auditivo externo 2 a 3 veces al día, hasta por 15 días.

En dermatitis:

- Cortar el pelo de la zona afectada y limpiarla.

- Esparcir varias gotas de **Transimed®** sobre la zona a tratar, 2 a 3 veces al día hasta por 10 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- La Polimixina B posee interacciones con antibióticos aminoglicósidos, Bacitracina, Quinidina, Quinina.
- El Citrato de Sodio intensifica el potencial nefrotóxico y neurotóxico de la Polimixina B.
- La Succinilcolina y Tubocurarina, pueden prolongar el bloqueo neuromuscular de la parálisis respiratoria asociada con el uso de Polimixina B.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales con el tímpano perforado debido al efecto ototóxico de Polimixina B.
- No usar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos acorde a lo indicado por el Médico Veterinario tratante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a los glucocorticoides.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

EFFECTOS ADVERSOS

- El uso de **Transimed®** por más de 7 días pudiera retrasar la cicatrización de heridas.
- El uso de **Transimed®** puede asociarse a la aparición de sordera o pérdida parcial de la audición en un pequeño número de perros sensibles (geriátricos). El déficit auditivo usualmente es temporal. Si durante el transcurso del tratamiento se detectan disfunciones vestibulares o de la audición, se debiera discontinuar la terapia y realizar un lavado del conducto auditivo externo.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO (Logo: perro y gato)

SUSPENSIÓN ÓTICA Y TÓPICA (Logo: gota)

AGITAR ANTES DE USAR

USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C. Una vez abierto utilizar el producto dentro de 3 semanas.
Descartar el producto sin utilizar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG No 0526-B

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-No 009803/21 Importado y Distribuido por: ZOO PHARMA INSUMOS VETERINARIOS S.R.L. Díaz Romero N° 1339 Zona Miraflores, La Paz-Bolivia Teléfono: 591 2223357

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador:
Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Importado y distribuido en Bolivia por:
ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario