

# XILA-10<sup>®</sup> - Solución Inyectable

---

## SEDANTE-ANALGÉSICO.



Xila-10, solución inyectable, produce un estado de sedación acompañado de una relajación muscular general y una reducción de las sensaciones dolorosas. Por sus propiedades farmacológicas se indica en:

- Manejo y transporte de animales excesivamente nerviosos o agresivos.
- Procedimientos de diagnóstico.
- Procedimientos dentales.
- Cirugías menores de corta duración, tales como: limpieza y sutura de heridas, remoción de neoplasias dérmicas, etc.
- Procedimientos ortopédicos como despalme y herraje.
- Pre-anestesia en cirugías mayores o prolongadas, con anestésicos generales o locales.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Caballos y bovinos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución inyectable.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Sedante-Analgésico.

### COMPOSICIÓN

---

---

Cada 1 mL de solución contiene:

Xilazina Clorhidrato.....117 mg

(equivalente a 100 mg de Xilazina base)

Excipientes c.s.p.....1 mL

## INDICACIONES

---

Xila-10, solución inyectable, produce un estado de sedación acompañado de una relajación muscular general y una reducción de las sensaciones dolorosas. Por sus propiedades farmacológicas se indica en:

- Manejo y transporte de animales excesivamente nerviosos o agresivos.
- Procedimientos de diagnóstico.
- Procedimientos dentales.
- Cirugías menores de corta duración, tales como: limpieza y sutura de heridas, remoción de neoplasias dérmicas, etc.
- Procedimientos ortopédicos como despalme y herraje.
- Pre-anestesia en cirugías mayores o prolongadas, con anestésicos generales o locales.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración por vía intravenosa lenta o intramuscular.

### **Dosis del principio activo:**

- Caballos: 0,6 - 1,1 mg/Kg, por vía E.V. lenta 2,2 - 3,0 mg/Kg, por vía I.M.
- Bovinos: 0,05 - 0,3 mg/Kg, por vía I.M.

### **Dosis del producto:**

- Caballos: 0,6 - 1,1 mL/100 kilos, por vía intravenosa lenta 2,2 - 3,0 mL/100 kilos, por vía I.M.
- Bovinos: 0,05 - 0,3 mL/100 kilos, por vía I.M.

Luego de la inyección de Xila-10, el animal se debe mantener en reposo hasta que se haya logrado el efecto deseado.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en hembras preñadas en el último tercio de gestación, excepto en el parto.
- No usar en concomitancia con estimulantes de adrenoreceptores (adrenalina,

noradrenalina, dopamina).

## PRECAUCIONES

---

Usar con precaución en animales con afecciones pulmonares, disfunción hepática o renal, enfermedad cardíaca severa, shock; o que se encuentren en condiciones de estrés, tales como calor o frío extremo, en altura, fatigados.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

En caballos, en dosis terapéuticas ocasionalmente puede causar leve temblor muscular, bradicardia con bloqueo AV parcial y una disminución de la frecuencia respiratoria. En bovinos se puede presentar salivación profusa y atonía ruminal.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 2 días.

**Leche:** 2 días.

## CONSERVACIÓN

---

Conservar en un lugar fresco y seco entre 15° y 30° C, y protegido de la luz.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco ampolla con 50 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

Reg. SAG N° 1837

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario