


PULLBIOTIC® Suspensión Inyectable

ANTIBIÓTICO INYECTABLE.



Indicado para el tratamiento infecciones por microorganismos sensibles a la Penicilina en bovinos, equinos y cerdos. Su uso en está indicado en el tratamiento de pasteurelosis neumónica y metritis post parto causada por microorganismos sensibles a la penicilina en bovinos; gurma, neumonía, abscesos y artritis séptica causada por microorganismos sensibles a la penicilina en equinos; y erisipelosis, pasteurelosis neumónica, pleuroneumonía y septicemias causadas por microorganismos sensibles a la penicilina en cerdos. Pullbiotic resulta indicado para las infecciones causadas por las siguientes especies bacterianas gram positivas: *Streptococcus spp.*, *Staphylococos-sensibles Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Actinomyces ovis*, *Bacillus anthracis*, *Fusiformis nodosus*, *Nocardia spp.* y algunas cepas de *Haemophilus*, *Actinobacillus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Neisseria spp.* y *Bacteroides spp.*

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico inyectable.

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión inyectable contiene:

Penicilina G Procaína.....150.000 U.I.

Penicilina G Benzatina.....150.000 U.I.

Excipientes c.s.p.....1 mL

PROPIEDADES

Pullbiotic es una asociación antibiótica de dos Penicilinas de liberación prolongada. La Penicilinas pertenecen a la familia de los Betalactámicos, que interfieren con las enzimas responsables de la formación de las conjugaciones entre los filamentos peptidoglicánicos, por lo tanto alteran el desarrollo de las paredes celulares bacterianas. La penicilina G tiene una gran actividad contra bacterias aeróbicas y anaeróbicas gram positivas.

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento infecciones por microorganismos sensibles a la Penicilina en bovinos, equinos y cerdos. Su uso en está indicado en el tratamiento de pasteurelosis neumónica y metritis post parto causada por microorganismos sensibles a la penicilina en bovinos; gurma, neumonía, abscesos y artritis séptica causada por microorganismos sensibles a la penicilina en equinos; y erisipelosis, pasteurelosis neumónica, pleuroneumonía y septicemias causadas por microorganismos sensibles a la penicilina en cerdos. Pullbiotic resulta indicado para las infecciones causadas por las siguientes especies bacterianas gram positivas: *Streptococcus spp.*, *Staphylococos-sensibles Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Actinomyces ovis*, *Bacillus anthracis*, *Fusiformis nodosus*, *Nocardia spp.* y algunas cepas de *Haemophilus*, *Actinobacillus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Neisseria spp.* y *Bacteroides spp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Vía intramuscular estricta en todas las especies.

Dosis:

- Bovinos y caballos: 2 mL por cada 50 Kg de peso corporal, en dosis única.

(Equivalente a 12.000 U.I. de Penicilina G / Kg de peso). Vía I.M. En caso necesario repetir el tratamiento a las 72 horas.

- Cerdos: 1 mL a 1,5 mL/25 Kg de peso corporal, en dosis única, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. (Equivalentes a 12.000 a 18.000 U.I. de Penicilina G/Kg de peso). Vía I.M. En caso necesario repetir el tratamiento a las 72 horas.

CONTRAINDICACIONES

- Contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las Penicilinas.
- Contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la Procaína.
- Debido a la posibilidad de reacción cruzada, las penicilinas se deben emplear con cautela en pacientes con hipersensibilidad documentada a otros antibióticos Betalactámicos (por ejemplo, Cefalosporinas, Cefamicinas).
- No administrar a hembras preñadas ni en lactancia.

PRECAUCIONES

- Agitar antes de usar.
- Lavarse las manos después de aplicar el producto.
- Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.

No administrar a equinos cuya carne se destine para consumo humano.

Leche: No administrar a animales cuya leche se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar al abrigo de la luz y a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1955-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario