


SINPUL-D

ANTIPARASITARIO EXTERNO



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

POLVO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN EXTERNA

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo

COMPOSICIÓN

Cada sachet con 20 g de polvo contiene: Deltametrina.....1,5 g
Carbarilo.....10,0 g Excipientes c.s.p.....20 g

INDICACIONES DE USO

Su uso está indicado para el tratamiento de pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros desde los 6 meses de edad y que presenten cargas parasitarias moderadas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo

DOSIS

Preparación: Vaciar todo el contenido de 1 sachet en un recipiente y agregar agua poco a poco, revolviendo hasta completar 10 litros. Esta preparación permite obtener una concentración final de baño de 0,015% de Deltametrina y 0,1% de Carbarilo.

Aplicación: Aplicar el producto mediante baño, mojando completamente todo el cuerpo del animal. Dejar secar sin frotar ni enjuagar.

En el caso de ser necesario, se puede repetir el baño con el producto por una única vez, 7 días

después de la primera administración.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La combinación de 2 o más compuestos con actividad anticolinesterasa ej. Carbarilo con otros compuestos organofosforados; pueden incrementar su toxicidad.

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en conjunto con otras drogas o pesticidas con actividad anticolinesterasa o con un mecanismo de acción similar (ej. Organofosforados).

No aplicar a perros con hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

No aplicar a perros que presenten heridas en su piel.

No aplicar a perros menores a 6 meses de edad.

No aplicar en animales en gestación, lactancia o reproductores.

No aplicar en animales enfermos o debilitados.

No usar en aves ornamentales.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Utilizar con precaución en razas predispuestas a hipersensibilidad por contacto con medicamentos o insecticidas tales como Poodle o Dalmata.

Evite que el animal ingiera el producto. En caso de ingesta accidental por el animal, consulte al Médico Veterinario.

Evite el contacto del producto con los ojos, boca u otras mucosas del animal tratado. En estas zonas se recomienda aplicar cuidadosamente utilizando un paño humedecido con el producto diluido.

Evite el lamido del animal después de la aplicación del producto.

En caso de irritación suspender el uso del producto y lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Utilizar guantes, mascarilla y gafas de protección al preparar y aplicar el producto.

No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto.

Lavar las manos inmediatamente después del tratamiento.

No manipular por mujeres embarazadas.

Evitar que los niños tengan contacto con el animal tratado hasta que éste se encuentre completamente seco.

En el caso de que exista contacto con la piel y/o con los ojos se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua.

En el caso de ingestión accidental se recomienda enjuagar la boca con abundante agua, sin inducir el vómito. Consultar a un médico de inmediato.

EFECTOS ADVERSOS

No se han descrito

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile

www.dragpharma.

www.mascotasonline.cl

REGISTROS

Reg. SAG No 2363

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario