


NANORMEN PUPPY

ANTIPARASITARIO INTERNO PARA CACHORROS



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SUSPENSIÓN ORAL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno para cachorros

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión oral contiene: Pirantel Pamoato.....14,4 mg (Equivalente a 5 mg de Pirantel base) Febantel.....15 mg Excipientes
c.s.p.....1 mL

INDICACIONES DE USO

Antiparasitario interno para cachorros, efectivo contra nematodos gastrointestinales de perros tales como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*.

MODO DE APLICACIÓN

- Agitar antes de usar.
- Administrar directamente en la cavidad oral o mezclado con el alimento.
- El producto puede ser administrado desde las dos semanas de vida.
- Con el objetivo de prevenir potenciales enfermedades parasitarias que se puedan transmitir desde los animales al hombre, se recomienda que el tratamiento de cachorros sea repetido cada 2 semanas, administrando el producto a las 2, 4, 6 y 8 semanas de edad, y luego una vez al mes hasta los 6 meses de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Dosis de los principios activos:

- Febantel: 15 mg/Kg en dosis única.
- Pirantel base: 5 mg/Kg en dosis única.

Dosis del producto:

Administrar 1 mL por cada Kg de peso en dosis única.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Pirantel interactúa con el Levamisol o con agentes colinérgicos tipo Nicotina. Cuando el Pirantel es administrado concomitantemente con Levamisol, la toxicidad del Levamisol puede acrecentarse.

El Pirantel interactúa con Piperazina. La parálisis y la relajación muscular causada por la acción anticolinérgica de la Piperazina puede contrarrestar el efecto contráctil muscular del Pirantel si ellos son administrados concomitantemente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar simultáneamente con compuestos que contengan Piperazina.
- No utilizar en conjunto con fármacos con propiedades anticolinérgicas, tales como organofosforados, ya que pueden producir potenciación en la toxicidad.
- No utilizar en conjunto con Levamisol o con agentes colinérgicos tipo Nicotina.
- No administrar en hembras preñadas o en período de lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Emplear con cautela en animales muy debilitados.
- Podría causar emesis en animales muy pequeños.
- No se ha evaluado la seguridad del medicamento en cachorros de menos de 2 semanas de edad.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavarse las manos después de administrar el producto.
- En caso de contacto con la piel se recomienda lavar las manos con jabón y abundante agua. Si se desarrolla irritación y esta persiste, consultar al médico.
- En el caso de existir contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por 15 minutos. Si se desarrolla irritación y esta persiste, consultar al médico.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG No 2290

Perú: Reg. SENASA F.08.36.I.1098

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario