


EQUINYL

ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA CABALLOS



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION TÓPICA

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicótico de amplio espectro para caballos

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución tópica contiene: Enilconazol.....100 mg Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES DE USO

Indicado para el tratamiento de dermatofitosis en caballos, producidas por: Trichophyton equinum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis y Microsporum gypseum.

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de iniciar el tratamiento con la solución diluida de **Equinyl** , se debe limpiar y/o bañar al caballo con un cepillo y jabón suave, retirando las costras y escamas que existan para así facilitar la penetración del principio activo en el pelaje.
- Las dos primeras aplicaciones se deben realizar cubriendo todo el cuerpo del animal, con el objetivo de alcanzar también lesiones subclínicas y esporas presentes en el pelaje. Luego, se debe aplicar la solución diluida únicamente en las lesiones, cubriendo una gran área alrededor de la piel afectada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica mediante baño o aspersion.

DOSIS

La solución de **Equinyl** , debe diluirse antes de su uso, añadiendo 1 parte de la solución en 50 partes de agua tibia hasta obtener una emulsión de Enilconazol al 0,2% (2 mg de sustancia activa / mL de agua), la cual debe ser utilizada para tratar por vía tópica al caballo. Se recomienda seguir las siguientes pautas de dilución:

- 10 mL de **Equinyl**®, concentrado, deben diluirse en 1/2 litro de agua tibia.
- 20 mL de **Equinyl**® , concentrado, deben diluirse en 1 litro de agua tibia. ®
- 100 mL de **Equinyl**®, concentrado, deben diluirse en 5 litros de agua tibia.
- 120 mL de **Equinyl**® , concentrado, deben diluirse en 6 litros de agua tibia.

La solución diluida de **Equinyl**® debe ser aplicada a intervalos de 3 a 4 días. La duración del tratamiento puede variar desde un mínimo de 4 aplicaciones hasta un máximo de 12 aplicaciones en casos graves. El tratamiento debe continuar hasta después de observar la resolución clínica y que se obtengan cultivos negativos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han informado interacciones específicas. Sin embargo, al igual que otros azoles, el tratamiento sistémico puede resultar en la inhibición de la enzima del citocromo P450.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en animales que presenten hipersensibilidad conocida a Enilconazol. - No usar en caballos de menos de 6 meses de edad. - No mojar con el producto las mucosas del animal (oral y ocular).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. - El producto diluido debe ser utilizado inmediatamente.

EFFECTOS ADVERSOS

- El desarrollo de efectos adversos en los animales tratados con la dosis recomendada es improbable, porque la absorción a través de la piel es muy baja.

- Cuando el producto **Equinyl**® es utilizado tal como es indicado, no se han registrado efectos adversos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Cero (0) días.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2586

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario