


DOGUICAN

COLLAR ANTIPULGAS PARA PERROS



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

COLLAR ANTIPULGAS

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Collar Antipulgas para Perros

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de collar contiene: Diclorovinil Fosfato (Diclorvós).....4,8 g Resinas plásticas (PVC) c.s.p.....100 g

INDICACIONES DE USO

Collar antiparasitario externo, efectivo contra pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.

MODO DE APLICACIÓN

- Coloque el collar holgadamente al perro. - Se recomienda dejar un espacio de dos dedos entre el collar y el cuello. - Corte el resto de collar que sobresale de la hebilla. - Cambiar el collar cada 4 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en hembras preñadas o en lactancia. - No usar en animales lactantes, enfermos o menores de 3 meses de edad. - No administrar en animales hipersensibles a compuestos organofosforados.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Sacar el collar cuando bañe al perro y colocarlo nuevamente una vez que el animal esté seco. - Evite que el animal juegue o ingiera el collar. - Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas. - Retirar el collar en caso de irritación en la zona de contacto, o si aparecen signos como salivación, vómitos o diarrea. En caso de irritación lavar con abundante agua. - El ajuste holgado y el recorte de las partes sobrantes ayudan a minimizar las posibilidades de dermatitis inducida por un collar con insecticida. - Solo para uso externo. - Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Evitar que los niños jueguen con el collar. - Lávese las manos luego de manipular el collar.

EFFECTOS ADVERSOS

Se han descrito dermatitis en el cuello de animales que usan collares impregnados con Diclorvós. Sin embargo, un collar de polivinilo liso, aun sin contener insecticida, puede provocar una dermatitis en el sitio de contacto si es que está muy ajustado y al aflojarlo no suele provocar problemas.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

VENENO (Ícono calavera)

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile

www.dragpharma.

www.mascotasonline.cl

REGISTROS

Reg. SAG No 936

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario