


# KAUPOL

---

**ADMINISTRADO EN FORMA CONCOMITANTE CON VITAMINAS B1, B6 Y B12, SE INDICA COMO PROTECTOR HEPÁTICO, LIPOTRÓPICO Y HEMATOPOYÉTICO.**



## Ficha Técnica

### FORMA FARMACÉUTICA

---

### SOLUCIÓN INYECTABLE

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

**ADMINISTRADO EN FORMA CONCOMITANTE CON VITAMINAS B1, B6 Y B12, SE INDICA COMO PROTECTOR HEPÁTICO, LIPOTRÓPICO Y HEMATOPOYÉTICO.**

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de solución inyectable contiene: Riboflavina 5 Fosfato Sódico.....10 mg  
Nicotinamida.....200 mg D-Glucosa Anhidra (Dextrosa).....10 g  
Sodio.....11,96 mEq Potasio.....0,54 mEq  
Magnesio.....0,049 mEq Calcio.....0,163 mEq  
Cloruro.....12,92 mEq Excipientes c.s.p.....100 mL

### INDICACIONES DE USO

---

Indicado en deshidrataciones y en deficiencias de glucosa y de minerales, las que pueden ser ocasionadas por: hemorragias, diarreas, quemaduras, carencias post parto y/o envenenamiento. En animales de producción, **Kaupol®**, administrado en forma concomitante con vitaminas B1, B6 y B12, se indica como protector hepático, lipotrópico y hematopoyético. Especialmente recomendado para animales debilitados, convalecientes, enfermos o sometidos a largas exigencias

### MODO DE APLICACIÓN

---

Administrar en forma aséptica. Para la administración por vía endovenosa el producto debe templarse hasta lograr temperatura corporal.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Vía endovenosa lenta estricta. Administración en dosis única.

Dosis del producto:

**Caballos (200 - 300 kilos) :** 500 mL vía EV. **Caballos ( $\geq$  400 kilos) :** 1.000 - 2.000 mL vía EV.

#### CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar en estados patológicos que requieran bajo aporte de Sodio. - No administrar en estados patológicos como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y enfermedades metabólicas.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. - La administración endovenosa debe realizarse con el producto a temperatura corporal.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. - En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

#### EFFECTOS ADVERSOS

---

Por vía endovenosa podría ocurrir irritación, daño endotelial y flebitis, para minimizar este riesgo el producto debe administrarse en una vena central y de manera lenta, esto también minimiza la presentación de signos como hipotensión, arritmias, paro cardíaco o edema. La inyección accidental de grandes volúmenes alrededor de la vena suele causar una inflamación local marcada, si esto ocurre detenga la administración, infiltre el tejido con solución salina normal y aplique tópicamente corticoesteroides.

#### PERÍODO DE RESGUARDO

---

Carne: 0 días. Leche: 0 días.

#### OBSERVACIONES

---

### USO VETERINARIO

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

---

**Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.**

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

#### REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG No 1351

**Costa Rica:** Reg. N° MV-4140

**Rep. Dominicana:** Reg. No 5914

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados

exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario