HEMODRAG® 20 mL - Solución Inyectable

HEMOSTÁTICO Y ANGIOPROTECTOR.

Hemodrag® está indicado para la prevención y tratamiento de las hemorragias en cirugía veterinaria, patologías de la reproducción y obstetricia, traumatología accidental y hemorragias localizadas en diversos órganos. Tiene efecto hemostático y angioprotector en procesos dérmicos como petequias, hematomas y heridas.

Hemodrag® es eficaz para todos los procesos hemorrágicos cualquiera sea su etiología (a excepción de las hemorragias causadas por agentes cumarínicos), debido a que actúa sobre la hemostasia primaria. Puede ser utilizado en castraciones de caballos y bovinos, corte de cola y castración en cerdos y en hemorragias puerperales en vacas y yeguas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION INYECTABLE

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Hemostático y Angioprotector.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:
Etamsilato.....125 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Hemodrag® está indicado para la prevención y tratamiento de las hemorragias en cirugía veterinaria, patologías de la reproducción y obstetricia, traumatología accidental y hemorragias localizadas en diversos órganos. Tiene efecto hemostático y angioprotector en procesos dérmicos como petequias, hematomas y heridas.

Hemodrag® es eficaz para todos los procesos hemorrágicos cualquiera sea su etiología (a excepción de las hemorragias causadas por agentes cumarínicos), debido a que actúa sobre la hemostasia primaria. Puede ser utilizado en castraciones de caballos y bovinos, corte de cola y castración en cerdos y en hemorragias puerperales en vacas y yeguas.

DOSIS

Administración por vía endovenosa lenta o intramuscular profunda.

Dosis del principio activo:
- Bovinos, caballos y cerdos: 5 a 12,5 mg/Kg de peso, cada seis horas, por 1 a 3 días, según sea necesario.

Dosis del producto:
- Bovinos, caballos y cerdos: 0,4 a 1 mL /10 Kg de peso, cada seis horas, por 1 a 3 días, según sea necesario.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacológicos.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en casos de porfiriasis aguda, ya que se ha visto que es porfiriogénico en animales.
- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto está indicado para el tratamiento de animales en forma individual. No tratar a toda la masa de animales.
- Los animales no deben ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento y/o inmediatamente luego de él.
- El producto se oxida en presencia de Oxígeno, por lo cual se debe descartar el volumen remanente después de la administración.
- En el caso de la administración intramuscular, si la dosis requerida es mayor a 20 mL, se sugiere dividirla en dos o más puntos de aplicación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Administrar con precaución. Lavarse las manos después de la aplicación del producto.
- Personas con hipersensibilidad conocida al Etamsilato deben evitar contacto con el medicamento.
- La autoinyección accidental puede provocar alteración de la presión arterial. En caso de ocurrencia, consultar inmediatamente con un médico y mostrar la etiqueta del producto.

EFECTOS ADVERSOS

No se han descrito.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

CONSERVACIÓN

Consérvese a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz.
Una vez abierto el envase utilizar dentro de 1 semana. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 20 mL

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1967
Perú: Reg. SENASA F.F3.01.I.0009
Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.
Costa Rica: Reg. N° MV-7150

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario