

REGAPIPEL® PLUS - Shampoo

ANTISÉPTICO Y ANTIMICÓTICO.



Para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada con infecciones por *Staphylococcus intermedius*, *Malassezia pachydermatis*, y como ayuda en el tratamiento de infecciones dermatófitas debidas a *Microsporum canis* en perros y gatos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiséptico y antimicótico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Clorhexidina Gluconato 20%..... 10 g
(Equivalente a 2 g de Clorhexidina Gluconato)

Miconazol Nitrato..... 2,3 g
(Equivalente a 2 g de Miconazol base)

Excipientes c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada con infecciones por *Staphylococcus intermedius*, *Malassezia pachydermatis*, y como ayuda en el tratamiento de infecciones dermatófitas debidas a *Microsporum canis* en perros y gatos.

MODO DE APLICACIÓN

- Moje al animal con abundante agua.
- Aplicar una cantidad suficiente del shampoo en varios puntos y masajear. Con la ayuda de una esponja esparcir para favorecer su penetración en la piel y el pelaje. Asegúrese de aplicar Regepipel® Plus alrededor de los labios, bajo la cola y entre los dedos por ser aquellas áreas reservorios de agentes causales.
- Dejar actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuagar con abundante agua limpia.
- Repetir dos o tres veces por semana hasta que los síntomas disminuyan y luego una vez por semana o según indicación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Clorhexidina se inactiva al ser usada con detergentes comunes o compuestos aniónicos.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en gatos menores a 6 semanas de edad y en perros menores a 4 semanas de edad.
- No administrar en los individuos que presenten hipersensibilidad conocida a algún componente de la preparación.
- No usar en hembras en periodo de gestación o lactancia.

PRECAUCIONES

Usar en gatos mayores de 6 semanas y en perros mayores de 4 semanas de edad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental lavar inmediatamente con

abundante agua.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- En el tratamiento de dermatofitosis, la asociación de la terapia tópica a la terapia sistémica favorece la cura de las lesiones en 6-9 semanas, tiempo menor al requerido cuando se administra sólo la terapia sistémica.
- En caso de irritación local, suspender el tratamiento.
- Evitar el contacto con los ojos del animal, en caso de contacto accidental lavar inmediatamente con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 150 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1696

Panamá: Reg. N° RF-8355-18

El Salvador: VE2013084783

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007259/16

Uruguay: Reg. MGAP N° 2019A00682

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador: Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Importado y distribuido en Bolivia por: AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importado en Uruguay por: VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario