

ROSTRUM® 2,5% - Suspensión Oral

ANTIBACTERIANO.



Rostrum®, es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de:

- Infecciones del tracto gastrointestinal (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*).
- Infecciones del tracto respiratorio (*Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Klebsiella spp.*).
- Infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis, cistitis. (*Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Infecciones cutáneas.
- Infecciones del conducto auditivo externo y otitis (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Dermatitis, heridas infectadas (*Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibacteriano.

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión oral contiene:

Enrofloxacino..... 25 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

PROPIEDADES

El Enrofloxacino es un agente antimicrobiano sintético perteneciente a la familia de las Fluoroquinolonas, que se caracterizan por ser antibióticos bactericidas que presentan una potente actividad antibacteriana frente a una gran variedad de microorganismos principalmente frente a bacterias Gram negativas, Gram positivas, Micoplasmas y Clamidias.

INDICACIONES

Rostrum®, es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de:

- Infecciones del tracto gastrointestinal (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*).
- Infecciones del tracto respiratorio (*Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Klebsiella spp.*).
- Infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis, cistitis. (*Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Infecciones cutáneas.
- Infecciones del conducto auditivo externo y otitis (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Dermatitis, heridas infectadas (*Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* y *Pseudomonas aeruginosa*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía administración oral.

Dosis del principio activo:

- Perros: 5 - 20 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 7-10 días. La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas.
- Gatos: 5 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 7-10 días. La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas. En caso de infección por micoplasmas la duración del tratamiento debe ser de 14 a 21 días.

Dosis del producto:

- Perros: 1 a 4 mL cada 5 Kg de peso corporal cada 24 horas* por 7 – 10 días.
- Gatos: 1 mL cada 5 Kg de peso corporal cada 24 horas* por 7-10 días.

* La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas. En caso de micoplasmosis, la duración del tratamiento debe ser de 14 a 21 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Los compuestos que contengan cationes di o trivalentes como Aluminio, Calcio, Magnesio, Hierro o Zinc pueden disminuir la absorción de Enrofloxacin. Así, por ejemplo los antiácidos que contengan cationes (Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+}) pueden unir Enrofloxacin e impedir su absorción.
- El Sucralfato puede inhibir la absorción de Enrofloxacin. Se recomienda separar ambas dosificaciones por al menos dos horas.
- El Enrofloxacin administrado con Teofilina puede aumentar sus niveles séricos. En perros el clearance de la Teofilina se redujo en un 43% cuando se administró en conjunto con Enrofloxacin en dosis de 5 mg/Kg cada 24 horas.
- La administración concomitante con otras drogas que tengan metabolismo hepático puede afectar la farmacocinética de una o ambas drogas.

CONTRAINDICACIONES

- El Enrofloxacin está contraindicado en animales con hipersensibilidad a las quinolonas.
- No administrar a perros de razas pequeñas a medianas menores de 1 año, ni a perros de razas grandes menores de 1 ½ año.
- No administrar a gatos menores a 8 semanas de edad.
- El uso de Enrofloxacin puede generar la formación de cristales en orina, por lo cual se recomienda no administrar en animales deshidratados.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES

Agítese vigorosamente antes de usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Las fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de susceptibilidad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de administrar el producto.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de susceptibilidad.

EFFECTOS ADVERSOS

- Se han reportado artropatías en animales inmaduros, especialmente en perros. El riesgo de artropatía aumenta cuando se aumenta la dosis, sin embargo también se ha reportado cuando se utilizan las dosis recomendadas en perros.
- Otros efectos adversos que se han descrito en muy raros casos (menos de 1 animal de cada 10.000 animales, incluyendo informes aislados) incluyen vómitos, anorexia, aumento de las enzimas hepáticas, ataxia, convulsiones, depresión, letargo y nerviosismo.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

- Consérvese a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C en un lugar seco.
- Protéjase de la luz.
- No congelar.

- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria retenida.

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. S.A.G. N° 2038

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006146/14

Costa Rica: MAG CL4-5-60-6094

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario