

# ROSTRUM<sup>®</sup> PLUS ÓTICO - Emulsión Ótica

---

ANTIBACTERIANO Y ANTIMICÓTICO.



Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacin y/o Sulfadiazina de Plata.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Emulsión ótica.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antibacteriano y antimicótico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL de emulsión contiene:

Enrofloxacin..... 5 mg

Sulfadiazina de Plata..... 10 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

## INDICACIONES

---

Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración tópica.

**Modo de empleo:** Limpiar el conducto auditivo, luego administrar ROSTRUM PLUS ÓTICO en cantidad suficiente para cubrir el canal auditivo externo, masajear suavemente el oído para asegurar una distribución completa y uniforme del medicamento por todo el conducto.

**Dosis del producto:** 5 a 10 gotas en perros que pesan 15 kilos o menos, y 10 a 15 gotas en perros que pesan más de 15 kilos. Administrar 2 veces al día por 14 días.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en perros que presenten hipersensibilidad a las Quinolonas y/o a las Sulfonamidas.
- No usar en perros con perforación de la membrana timpánica.
- No usar durante la gestación y la lactancia.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- El uso de esta asociación no ha sido evaluado en perros con perforación de la membrana timpánica. En consecuencia, antes de administrar el producto se debiera examinar el canal auditivo externo con el objetivo de asegurar que no exista ruptura de la membrana timpánica, con el objetivo de evitar contaminación del oído medio, como también lesiones vestibulares y cocleares. Si durante la administración del producto existiera signos de sordera o alteraciones vestibulares descontinúe su uso.
- Las quinolonas debieran utilizarse con precaución en animales con desordenes del sistema nervioso central (SNC). En esos animales, en casos poco frecuentes las quinolonas han sido asociadas a estimulación del SNC, lo cual puede generar convulsiones.
- El uso de la preparación no ha sido evaluado en perros con propósitos reproductivos, durante la preñez o en hembras lactantes.

**Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
- No arrojar el envase vacío o con restos del producto, en ríos lagos o torrentes de agua.

#### ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

#### OBSERVACIONES

---

Agitar antes de usar.

#### CONSERVACIÓN

---

Mantener en un lugar fresco, a temperatura entre 15° y 30°C, al abrigo de la luz.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco gotario con 15 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 1523
- El Salvador: Reg. N° VET.2006-12-3528

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario

