

# ULTRAFIL® Suspensión Ótica

---

ANTIBACTERIANO, ANTIMICÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.



Ultrafil es indicado para el tratamiento agudo o crónico de las otitis externas asociadas con la presencia de levaduras, hongos (*Microsporum sp.*, *Candida sp.*, *Trichophyton sp.*, *Epidermophyton sp.*, *Malassezia pachydermatis*) y bacterias susceptibles a Gentamicina (*E. coli*, *Pseudomonas sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*), que se puede asociar a la presencia de inflamación o prurito.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión ótica.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antibacteriano, antimicótico y antiinflamatorio esteroidal.

### COMPOSICIÓN

---

#### Cada 100 mL de suspensión contiene:

Betametasona Dipropionato.....0,12 g

(Equivalente a 0,10 g de Betametasona base)

Gentamicina Sulfato.....0,46 g

(Equivalente a 0,30 g de Gentamicina base)

Clotrimazol.....1,00 g

Excipientes c.s.p.....100,0 mL

## INDICACIONES

---

Ultrafil es indicado para el tratamiento agudo o crónico de las otitis externas asociadas con la presencia de levaduras, hongos (*Microsporum sp.*, *Candida sp.*, *Trichophyton sp.*, *Epidermophyton sp.*, *Malassezia pachydermatis*) y bacterias susceptibles a Gentamicina (*E. coli*, *Pseudomona sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*), que se puede asociar a la presencia de inflamación o prurito.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Lavar y luego limpiar el conducto auditivo externo con una solución limpiadora ótica, remover todo el material extraño, verificar la integridad de la membrana timpánica e instilar 3 a 5 gotas de Ultrafil® diariamente dentro del conducto auditivo, hasta por 7 días consecutivos.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No utilizar en animales con indicios de perforación de la membrana timpánica.
- No usar concomitantemente con alguna droga que pueda inducir ototoxicidad.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

---

El uso de Ultrafil® puede ser asociado a la presencia de pérdida parcial o total de la audición en individuos sensibles (geriátricos, disfunciones renales), que puede ser temporal. Si persiste se recomienda discontinuar el tratamiento, y lavar el conducto auditivo.

## CONSERVACIÓN

---

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco de 15 mL con cánula.

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 210-B
- Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-41-04-4138
- El Salvador: Reg. N° VE.2013-04-4703

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario