

# URSOVET® Suspensión Oral

---

COLERÉTICO, CITOPROTECTOR E INMUNOMODULADOR.



Ursovet® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias que cursan con colestasis hepatobiliar, en perros y gatos. Por sus propiedades coleréticas, citoprotectoras e inmunomoduladoras su uso es útil en cuadros de hepatitis crónica, colangitis, colangiohepatitis y cuadros de colestasis que no cursen con obstrucción biliar.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### DESCRIPCIÓN

---

Colerético, citoprotector e inmunomodulador.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión Oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Colerético, citoprotector e inmunomodulador.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 1 mL de suspensión oral contiene:

Ácido Ursodeoxicólico..... 50 mg

Excipientes c.s.p. ....1 mL

## INDICACIONES

---

Ursovet® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias que cursan con colestasis hepatobiliar, en perros y gatos. Por sus propiedades coleréticas, citoprotectoras e inmunomoduladoras su uso es útil en cuadros de hepatitis crónica, colangitis, colangiohepatitis y cuadros de colestasis que no cursen con obstrucción biliar.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Vía de administración oral.

**Dosis del principio activo en perros y gatos:** 10 a 15 mg/Kg, cada 24 horas o divididas cada 12 horas.

### Dosis del producto:

- **Perros:** 2 a 3 mL por cada 10 Kg de peso corporal, cada 24 horas o divididas cada 12 horas.
- **Gatos:** 0,2 a 0,3 mL por cada Kg de peso corporal, cada 24 horas o divididas cada 12 horas. Se recomienda que tratamiento sea administrado por 3 a 4 meses después de que el paciente haya presentado mejoría en los marcadores bioquímicos indicadores de patología hepática.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No utilizar en pacientes que presenten obstrucción biliar, fístula, pancreatitis u otra complicación asociada a coledoclitiasis.
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a ácidos biliares.
- No utilizar en conejos u otras especies fermentadoras colónicas. En estas especies el ácido Ursodeoxicólico es convertido a ácido Litocólico (tóxico).
- Se debe tener especial precaución en pacientes con enfermedad hepática crónica, ya que pueden presentar mayor dificultad en metabolizar ácidos biliares.

## PRECAUCIONES

---

- No utilizar en hembras gestantes ni durante el periodo de lactancia.
- En algunos casos poco frecuentes, pudiera existir episodios de vómitos y/o diarrea. En tal caso, descontinúe su uso y consulte a su Médico Veterinario.
- Los antiácidos que contienen aluminio o la resina colestiramina pueden fijar ácido

Ursodeoxicólico, reduciendo su eficacia.

## ADVERTENCIAS

---

- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Lavarse las manos después de administrar el producto.

## OBSERVACIONES

---

Agitar antes de usar. Incluye jeringa dosificadora y gotario.

## CONSERVACIÓN

---

Conservar a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C.

Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese periodo de tiempo.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 60 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

Reg. S.A.G. N° 2034

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario