

CALMEDRAG® Comprimido Oral

ANSIOLÍTICO.



Indicado como tratamiento para la ansiedad por separación.

El tratamiento con Calmedrag® debe ser apoyado con terapia de manejo conductual.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Ansiolítico.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Clomipramina Clorhidrato20 mg
(Equivalentes a 17,9 mg de Clomipramina base)
Excipientes c.s.p.....1 comp.

PROPIEDADES

La Clomipramina Clorhidrato es un antidepresivo tricíclico que inhibe la recaptación presináptica de serotonina y de norepinefrina y con ello produce efectos ansiolíticos, anticomulsivos, antiagresivos y antidepresivos. Como resultado se pueden apreciar cambios significativos en la conducta de los perros sometidos a terapias con Clomipramina.

INDICACIONES

Indicado como tratamiento para la ansiedad por separación.

El tratamiento con Calmedrag® debe ser apoyado con terapia de manejo conductual.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración vía oral.

Depositar el comprimido lo más atrás posible en el hocico del perro, mantener el hocico cerrado y estimular la deglución.

Se recomienda al inicio de la terapia, administrar el producto junto con el alimento para reducir la posibilidad de efectos secundarios como el vómito.

Dosis del principio activo:

- 2 mg de Clomipramina Clorhidrato por kilogramo de peso corporal (2 mg/Kg) cada 12 horas por 2-3 meses.

Dosis del producto:

- 1 comprimido de CALMEDRAG® por cada 10 Kg de peso corporal (1 comp./10 Kg) cada 12 horas por 2-3 meses.
Es recomendable suspender la terapia en forma gradual.

SOBREDOSIS: La Clomipramina en general es un medicamento bastante seguro y tolerado por los perros. En esta especie las dosis letales son aproximadamente entre 50 y 100 mg/Kg al día por vía oral, es decir 12,5 a 25 veces la dosis terapéutica recomendada. No obstante lo anterior, las sobredosis con antidepresivos tricíclicos son riesgosas para la vida (arritmias, convulsiones, colapso cardiorrespiratorio).

No existe antídoto conocido para la Clomipramina.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Debido a los efectos aditivos, la Clomipramina se debe administrar con precaución cuando se emplea en forma concomitante con otros agentes anticolinérgicos o depresores del SNC.
- Los antidepresivos tricíclicos empleados con agentes antitiroideos pueden

incrementar el riesgo potencial de agranulocitosis.

- La cimetidina puede inhibir el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos incrementando el riesgo de toxicidad.
- El uso en combinación con agentes simpaticomiméticos puede aumentar el riesgo de efectos cardíacos (arritmias, hipertensión, hiperpirexia).
- No administrar en forma concomitante con inhibidores de la MAO (Selegilina, Amitraz).

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a agentes tricíclicos
- No administrar a animales de peso inferior a 2,5 Kg.
- No administrar a perros machos reproductores
- No administrar a hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar a cachorros menores de 6 meses de edad.
- No administrar en forma concomitante con inhibidores de la MAO (Selegilina, Amitraz)

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en perros con antecedentes de convulsiones, hipomotilidad gastrointestinal, retención urinaria, anormalidades del ritmo cardíaco o incremento en la presión intraocular.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavarse las manos después de manipular y/o administrar el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- La ingesta accidental deberá ser considerada peligrosa.
- Usar con precaución las personas con sensibilidad conocida a la Clomipramina.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

- Los síntomas y signos adversos más frecuentemente observados incluyen náuseas, vómitos y letargia o somnolencia transitoria.
- La sedación ocurre típicamente al inicio de la terapia y es usualmente autolimitante, tan pronto como los perros llegan a ser tolerantes a ésta.
- El vómito ha sido reportado especialmente en perros que han recibido Clomipramina con el estómago vacío, por lo que se recomienda administrarla junto con los alimentos.

- Podría haber, aunque en forma improbable, anorexia, diarrea, hiperactividad de enzimas hepáticas y algunos efectos anticolinérgicos (por ejemplo, boca seca).

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15º y 30º C.

CONDICIÓN DE VENTA

Store in a cool and dry place, at room temperature between 15º and 30 ° C.

PRESENTACIÓN

Estuche con 30 comprimidos.

CÓDIGOS QAD DE PRESENTACIONES

Chile: Sale withheld veterinary prescription
Uruguay: exclusive sale under msp recipe (green recipe)

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2178
Uruguay: Reg. MGAP N° 2017A00466

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importador en Uruguay por:
VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

ARCHIVOS DESCARGABLES

[Calmedrag](#)

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario