

DEPODRAG[®] EQUINO - Suspensión Inyectable

ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.



Antiinflamatorio de depósito para desórdenes alérgicos, dermatológicos y artritis.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio esteroide.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de suspensión contiene:
Triamcinolona Acetonido..... 6 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Antiinflamatorio de depósito para desórdenes alérgicos, dermatológicos y artritis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Intramuscular, subcutánea, intraarticular e intrasinovial.

Dosis recomendada:

Caballos:

- Vía intramuscular o subcutánea: 2 a 5 mL en dosis única.
- Vía intraarticular o intrasinovial: 1 a 5 mL en dosis única. Repetir en caso necesario bajo recomendación Médico Veterinaria.

No es recomendable repetir el tratamiento más allá de 3 veces consecutivas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- La Anfotericina B o diuréticos calioréticos (Furosemida, Tiacidas) puede causar hipopotasemia cuando se administran en forma concomitante con glucocorticoides. Cuando estas drogas se utilizan simultáneamente con glucósidos digitálicos, puede aumentar la posibilidad de toxicidad si se genera hipopotasemia. Se recomienda la supervisión diligente de los niveles de Potasio y del digitálico.
- Los glucocorticoides pueden reducir los niveles sanguíneos de salicilatos.
- Los requerimientos de insulínicos pueden aumentar en los pacientes que reciben glucocorticoides.
- La Fenitoína, Fenobarbital, Rifampicina pueden aumentar el metabolismo de glucocorticoides.
- La administración concomitante de glucocorticoides y ciclosporina pueden aumentar los niveles sanguíneos de cada uno, con inhibición mutua del metabolismo hepático. Es incierta la importancia clínica de esta interacción. Los glucocorticoides también pueden inhibir el metabolismo hepático de la Ciclofosfamida. Se pueden requerir ajustes de la dosificación.
- El Mitotano puede alterar el metabolismo de esteroides; dosis mayores que las usuales pueden ser necesarias para tratar la insuficiencia adrenal inducida por Mitotano.
- Los pacientes tratados con corticoesteroides en dosis inmunosupresoras no deberían recibir vacunas vivas a virus vivos atenuados porque se puede potenciar la replicación viral. Una respuesta inmune disminuida puede ocurrir después de la administración de una vacuna, toxoide, o bacterina, en pacientes que reciben glucocorticoides.
- La administración de drogas ulcerogénicas (e.j., antiinflamatorios no esteroideos) con glucocorticoides puede aumentar el riesgo de ulceración gastrointestinal.

- Los efectos de la Hidrocortisona, y posiblemente de otros glucocorticoides, pueden ser potenciados por la administración concomitante con estrógenos.
- En pacientes con miastenia gravis, la administración concomitante de glucocorticoides y anticolinesterasas (e.j., Piridostigmina, Neostigmina, etc.) puede inducir debilidad muscular pronunciada. Si es posible, suspender la medicación anticolinesterasa por lo menos 24 horas antes de la administración del glucocorticoide.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en procesos infecciosos virales e infecciones fúngicas generalizadas.
- No usar en desórdenes músculo-esqueléticos donde se requiera inmovilidad.
- No usar en animales con tuberculosis, nefritis crónica o síndrome de Cushing, excepto por terapia de emergencia.
- No usar en caso de metaplasia ósea y osteoporosis.
- No usar en tratamiento de laminitis.
- No usar en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal o cardíaca.
- No usar en pacientes con hipersensibilidad al principio activo.
- No usar en animales con úlcera gastrointestinal o corneal.
- No usar en hembras gestantes o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- El producto es irritante en el caso de contacto con los ojos. Puede ser peligroso en el caso de ingestión accidental y en el caso de contacto con la piel.
- Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- En infecciones bacterianas el uso debe estar asociado a antibacterianos.
- Los corticoesteroides pueden precipitar el trabajo de parto durante los estadios finales de la gestación.
- Agitar antes de usar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:

El uso prolongado de Depodrag® puede causar efectos supresores en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal llevando a una atrofia adrenal (insuficiencia adrenal). También puede ocasionar resorción ósea o inhibición del crecimiento y de la reparación ósea, inhibición de la síntesis de colágeno, disminución de la tasa de crecimiento, retardo en la

cicatrización, diarrea, irritación gastrointestinal, ulceración gastrointestinal, cambios hematopoyéticos, retención de Sodio y de líquido y recrudescimiento de infecciones latentes.

Los efectos colaterales más frecuentes son poliuria, polidipsia, polifagia, letargia, debilidad y alopecia bilateral. Menos frecuentes son la pérdida de peso, anorexia y diarrea.

PERÍODO DE RESGUARDO

No usar en caballos destinados al consumo humano.

OBSERVACIONES

Uso durante la preñez, lactancia y en animales reproductores:

- No usar en hembras en gestación y lactancia.
- Los glucocorticoides probablemente sean necesarios para el desarrollo fetal normal.
- Pueden ser requeridos para la producción adecuada de surfactante y desarrollo de mielina, retina, páncreas y mamas.
- Las dosis excesivas tempranas en la gestación pueden conducir a efectos teratogénicos. En caballos, la administración de esteroides exógenos puede inducir el parto cuando se emplean en estadios finales de preñez, Se recomienda no usar altas dosis en animales gestantes.
- Los glucocorticoides no ligados a proteínas plasmáticas ingresan a la leche. Las dosis altas o administración prolongada en las madres, potencialmente pueden inhibir el crecimiento de los recién nacidos.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

Uruguay: Desechar el envase del producto en el centro de acopio más cercano

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2° y 30° C, protegido de la luz. Una vez abierto, utilizar dentro de 3 meses. Descartar el producto sin utilizar después de ese periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 20 mL y estuche con 3 frascos ampolla de 5 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 0529
- Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 005515/13
- Uruguay: Reg. MGAP N° A-4493
- Rep. Dominicana: Reg. N° 5607
- Perú: Reg. SENASA F.06.42.I.0240

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario