

# DF-7<sup>®</sup> Pasta oral

---

## ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO



Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Indicado en el tratamiento de parásitos nemátodos gastrointestinales y migratorios en estado adulto y larvario. También es efectivo contra *Gasterophilus spp.* y *Anoplocephala perfoliata* en caballos.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Caballos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Pasta oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario interno de amplio espectro

### COMPOSICIÓN

---

Cada jeringa con 40 g de pasta contiene:

Ivermectina.....0,12 g

Pamoato de Pirantel.....17,11 g

(Equivalente a 5,94 g de Pirantel)

Excipientes c.s.p.....40,00 g

## INDICACIONES

---

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Indicado en el tratamiento de parásitos nemátodos gastrointestinales y migratorios en estado adulto y larvario. También es efectivo contra *Gasterophilus spp.* y *Anoplocephala perfoliata* en caballos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

### **Dosis de los principios activos:**

9,9 mg de Pirantel y 0,2 mg de Ivermectina/ Kg de peso corporal.

### **Dosis del producto:**

Administrar por vía oral, una marca en la jeringa graduada (10 gramos) por cada 150 kilos de peso corporal.

En caso de infestación alta, repetir el tratamiento según indicación médico veterinaria.

40 gramos de D.F. 7® pasta alcanzan para tratar 600 kilos de peso. Administrar por vía oral, una marca en la jeringa graduada (10 gramos) por cada 150 kilos de peso. En caso de infestación alta, repetir el tratamiento según indicación médico veterinaria. 40 gramos de DF-7® alcanzan para tratar 600 kilos de peso.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

No utilizar en forma simultánea con Morantel o Levamisol.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en caballos menores de 4 semanas de edad.
- No usar durante la preñez o en periodo de lactancia, ni en animales reproductores.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

### **Advertencias y precauciones de uso:**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

### **Efectos no deseados y reacciones adversas:**

Los componentes de D.F. 7® pasta tienen un amplio margen de seguridad. Sin embargo, en caso de infestaciones elevadas, el tratamiento puede generar cólicos transitorios y heces blandas producto de la destrucción parasitaria.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

No administrar en animales destinados a consumo humano.

### OBSERVACIONES

---

#### **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. Contactar a la empresa fabricante o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, para recibir recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

### CONSERVACIÓN

---

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C.  
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

### PRESENTACIÓN

---

Estuche con 1 jeringa de 40 gramos

### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

### REGISTROS

---

- **Chile:** Reg. SAG N° 0487-B
- **Rep. Dominicana:** Reg. N° 5601
- **Perú:** Registro SENASA F.08.43.I.1069

### PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.  
Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario