

# DIPRAMIDA® Solución Oral

---

ANTIEMÉTICO - GASTROCINÉTICO.



Indicado en el manejo de vómitos de diversa etiología, en esofagitis por reflujo y en trastornos de la motilidad gástrica. También se indica en la preparación de estudios radiológicos del tubo digestivo.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiemético - Gastrocinético.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 1 mL de solución oral contiene:  
Metoclopramida Clorhidrato Monohidrato.....5,27 mg  
(Equivalente a 5 mg de Metoclopramida Clorhidrato)  
Excipientes c.s.p .....1 mL

### INDICACIONES

---

Indicado en el manejo de vómitos de diversa etiología, en esofagitis por reflujo y en trastornos de la motilidad gástrica. También se indica en la preparación de estudios radiológicos del tubo digestivo.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración oral.

### **Dosis del principio activo:**

0,25 - 0,5 mg/Kg, tres veces al día.

### **Dosis del producto:**

1 - 2 gotas/Kg de peso, tres veces al día.

Administrar 30-45 minutos antes de la alimentación y al momento de dormir.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- Evitar su administración concomitante con anticolinérgicos. La Atropina puede bloquear el efecto de Metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal.
- Los tranquilizantes fenotiazínicos pueden potenciar los efectos a nivel central.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar en cuadros de obstrucción gastrointestinal o perforación.
- No administrar en pacientes con hipersensibilidad a la Metoclopramida.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- En el caso de contacto con la piel o los ojos se recomienda lavar con abundante agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

## ADVERTENCIAS

---

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda administrar con precaución en pacientes epilépticos.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

En perros, las reacciones adversas más comunes, Aunque poco frecuentes, incluyen cambios en el estado mental y comportamiento (inquietud, espasmos involuntarios, agresión, hiperactividad o somnolencia y depresión). Los gatos pueden mostrar signos de excitación o desorientación. Ambas especies pueden desarrollar estreñimiento en tratamientos prolongados.

#### OBSERVACIONES

---

Agitar antes de usar.

#### **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

#### CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15° y 30° C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco con 20 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG N°: 1818

**Perú:** Registro SENASA F.43.32.I.0020

#### PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.  
Av. Manuel Olgúin N° 501 Oficina N° 604  
Santiago de Surco Lima.

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario