

# DRAGBUTEROL® Gel Oral

---

## BRONCODILATADOR.



**Dragbuterol®** se indica principalmente en el tratamiento de enfermedades obstructivas del tracto respiratorio en caballos, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades respiratorias alérgicas. También se indica por su acción mucolítica como co-adyuvante en el tratamiento de enfermedades respiratorias infecciosas, como neumonías y bronquitis.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Caballos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Gel oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Broncodilatador.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de gel contiene:  
Clenbuterol Clorhidrato..... 2,0 mg  
Excipientes c.s.p.....100 mL

### INDICACIONES

---

**Dragbuterol®** se indica principalmente en el tratamiento de enfermedades obstructivas del tracto respiratorio en caballos, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades respiratorias alérgicas. También se indica por su acción mucolítica como co-adyuvante en el tratamiento de enfermedades respiratorias infecciosas, como neumonías y bronquitis.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración oral.

### **Dosis del principio activo:**

- Dosis inicial: 0,8 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas.

Si luego de 3 días de tratamiento (6 dosis) no se observa mejoría aumentar la dosis según el siguiente esquema:

- 1,6 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 2,4 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 3,2 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días.

### **Dosis del producto:**

- Dosis inicial y cuadros obstructivos leves: 4 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 30 días.
- Cuadros bronco obstructivos severos: dosis máxima de 12-16 mL/100 Kg de p.v. cada 12 horas por 30 días.

Si luego de 3 días de tratamiento (6 dosis) con la dosis inicial no se observa mejoría, aumentar la dosis según el siguiente esquema:

- 8 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 12 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 16 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días.

Una vez establecida la dosis terapéutica continuar el tratamiento por 30 días. Si los signos vuelven a aparecer, el tratamiento se puede repetir por 30 días más, pero la determinación de la dosis efectiva se debe realizar nuevamente por etapas.

Si luego de administrar la dosis superior no se observa efecto, significa que el animal es no respondedor a Clenbuterol o bien que el cuadro obstructivo no es de origen bronquial, entonces se debe suspender el tratamiento.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- La administración concomitante con otras aminas simpaticomiméticas (por ejemplo Terbutalina) puede acrecentar los efectos adversos del Clenbuterol.
- El empleo con anestésicos inhalatorios (por ejemplo Halotano, Isoflurano) puede predisponer a arritmias ventriculares, de manera particular en pacientes con enfermedad cardíaca preexistente.

- La utilización con glucósidos digitálicos puede incrementar el riesgo de arritmias cardíacas.
- Los  $\beta$ -bloqueadores (por ejemplo Propanolol) pueden antagonizar los efectos del Clenbuterol.
- El Clenbuterol puede antagonizar los efectos de la Prostaglandina F2 y la Oxitocina.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar en animales hipersensibles a Clenbuterol Clorhidrato.
- No administrar en caballos que presenten trastornos cardiovasculares.
- No administrar en yeguas en gestación avanzada ni en período de lactancia.
- No administrar a machos reproductores.
- No administrar a crías.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- No se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis superior a la dosis inicial establecida.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- No manipular por personas hipersensibles a Clenbuterol Clorhidrato.
- No manipular por mujeres embarazadas.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

### **Efectos adversos y reacciones adversas:**

Se puede presentar taquicardia moderada, sudoración, temblor muscular, urticaria e inquietud durante los primeros días de tratamiento. También se describe, aunque en baja frecuencia, la presencia de ataxia.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

No administrar en animales cuya carne se destine a consumo humano.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos

de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

#### CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 3 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria retenida.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco con 50 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 1866

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario