

# EQUS<sup>®</sup> 20% - Solución Inyectable

---

ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO.



Equs<sup>®</sup> es un antiinflamatorio y analgésico que puede ser usado en inflamaciones musculoesqueléticas, claudicaciones leves, inflamaciones de tejidos blandos y traumatismos.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Caballos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución inyectable.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiinflamatorio - Analgésico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de solución contiene:  
Fenilbutazona.....20 g  
Excipientes c.s.p.....100 mL

### INDICACIONES

---

Equus® es un antiinflamatorio y analgésico que puede ser usado en inflamaciones musculoesqueléticas, claudicaciones leves, inflamaciones de tejidos blandos y traumatismos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Vía de administración endovenosa.

### **Dosis del principio activo:**

- 2,2 – 4,4 mg/Kg de peso cada 12 horas por 5 días.

### **Dosis del producto:**

- 0,5 – 1 mL/45 Kg de peso cada 12 horas por 5 días. La dosis más alta de 4,4 mg/Kg (1 mL/45 Kg de peso) no debe usarse más allá del primer día de tratamiento.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

Los anabólicos inhiben el metabolismo de la Fenilbutazona.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar a animales con insuficiencia cardíaca, renal o hepática.
- No administrar a hembras preñadas ni en lactancia.
- No administrar en animales deshidratados.
- No administrar a animales con lesiones en la mucosa gastrointestinal.
- No administrar en animales hipersensibles al activo.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En potrillos hay mayor riesgo de intoxicación por falta de madurez de los sistemas enzimáticos.
- En potrillos se recomienda su uso cuidadoso debido a la mayor incidencia de hipoproteinemia y ulceración gastrointestinal.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

Los principales efectos adversos reportados son gastrointestinales. Los signos clínicos incluyen disminución del apetito, depresión, cólicos, pérdida de peso, edema abdominal, hipoproteinemia y diarrea. Pueden ocurrir hemorragias y úlceras en la boca, esófago,

estómago, intestino, ciego y colon dorsal derecho.

#### PERÍODO DE RESGUARDO

---

No administrar a caballos cuya carne se destine al consumo humano.

#### OBSERVACIONES

---

#### **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

#### CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco ampolla con 100 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

Chile: Reg. SAG N° 64

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario