


# FEBRECTAL<sup>®</sup> BOVINO - Solución Inyectable

---

ANTIINFLAMATORIO ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO.



Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Recomendado para aliviar la inflamación, la fiebre y el dolor asociado con desórdenes músculo esqueléticos y aliviar el dolor asociado a cólico.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Caballos, bovinos y cerdos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución inyectable.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiinflamatorio Analgésico y Antipirético.

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL de solución contiene:  
Flunixin Meglumina.....83 mg  
(Equivalente a 50 mg de Flunixin)  
Excipientes c.s.p.....1 mL

### INDICACIONES

---

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Recomendado para aliviar la inflamación, la fiebre y el dolor asociado con desórdenes músculo esqueléticos y aliviar el dolor asociado a cólico.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

- Caballos: 1,1 mg/Kg/día (1 mL/45 Kg de peso) EV o IM, repetir por un máximo de 5 días.
- Bovinos: 2,2 mg/Kg/día (2 mL/45 Kg de peso) EV, en una o dos administraciones.
- Cerdos: 2,2 mg/Kg/día (2 mL/45 Kg de peso) IM por un máximo de 3 días.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- Se debe evitar la administración concurrente de fármacos potencialmente nefrotóxicos.
- El Flunixin puede disminuir la excreción renal de algunos fármacos, incrementando su toxicidad.
- El medicamento no debe administrarse junto con otros AINEs o glucocorticoides, ya que puede aumentar la toxicidad de ambos, especialmente a nivel a nivel gastrointestinal, aumentando el riesgo de sufrir úlceras gastrointestinales

### CONTRAINDICACIONES

---

- No utilizar en animales con hipersensibilidad al principio activo u otros AINEs.
- No utilizar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- No utilizar en animales con lesiones del tracto gastrointestinal, como úlceras y hemorragias.
- No utilizar cuando existen signos de discrasias sanguíneas o alteración de la hemostasia.
- No utilizar en casos de cólico causado por íleo y asociado a deshidratación.
- No utilizar en animales que padezcan desórdenes musculoesqueléticos crónicos.
- No administrar a animales menores de 72 horas de vida.
- No administrar en hembras preñadas, en lactancia o en animales reproductores.

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.
- Evitar la autoinyección.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

- En caballos después de la inyección IM, se han reportado casos de inflamación localizada, induración, rigidez y sudoración.
- La inyección intraarterial accidental puede causar estimulación del sistema nervioso central con signos tales como, ataxia, hiperventilación y debilidad muscular. Los signos clínicos son transitorios y generalmente no requieren ningún tratamiento.
- El Flunixin es un agente relativamente seguro para su uso en el caballo, pero existe la posibilidad de que se produzca intolerancia gastrointestinal, hipoproteinemia y anomalías hematológicas.
- En caballos y bovinos, se han informado reacciones anafilácticas poco usuales, principalmente después de una administración EV rápida.
- Se ha informado de hematoquecia y hematuria en bovinos tratados por más tiempo que la recomendación de 3 días.
- En cerdos, no se han reportado reacciones adversas, salvo algunos casos de irritación en el punto de inyección.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

- No usar en caballos destinados a consumo humano.
- Bovinos: 7 días carne, 2 días leche.
- Cerdos: 21 días carne.

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días.

Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco ampolla con 50 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 393
- Rep. Dominicana: Reg. N° 5602

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario