

HASYUN[®] Solución Inyectable

ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.



Indicado en el tratamiento de shock; en desórdenes inflamatorios y alérgicos en perros, gatos, bovinos, caballos y cerdos; cetosis primaria en bovinos; inducción de parto en bovinos, ovinos y cerdos e hipoadrenocorticismos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, cerdos, caballos, ovinos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Dexametasona Sodio Fosfato.....5,26 mg
(Equivalente a 4 mg de Dexametasona base)
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de shock; en desórdenes inflamatorios y alérgicos en perros, gatos, bovinos, caballos y cerdos; cetosis primaria en bovinos; inducción de parto en bovinos, ovinos y cerdos e hipoadrenocorticismos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intravenosa, intramuscular.

ESPECIE	DOSIS DEL PRINCIPIO ACTIVO SEGÚN	DOSIS DEL PRODUCTO
---------	----------------------------------	--------------------

ESPECIE	TERAPIA	SEGÚN TERAPIA
Perros	Desórdenes inflamatorios: 0,05-0,2 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios: 0,125-0,5 mL/10 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Gatos	Desórdenes inflamatorios: 0,1-0,3 mg/Kg de peso vivo al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios: 0,1-0,3 mL/4Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. Shock: 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Bovinos	Desórdenes inflamatorios, cetosis: 0,0125- 0,05 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Inducción de parto: 0,05-0,075 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	Desórdenes inflamatorios, cetosis: 1,25-5 mL/400 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Inducción de parto: 5- 7,5 mL/400 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Cerdos	Desórdenes inflamatorios: 0,02-0,08 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Shock: 0,5-5 mg/Kg, vía I.V.	Desórdenes inflamatorios: 0,5-2 mL/100 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. Shock: 0,125-1,25 mL/Kg, vía I.V.
Ovinos	Inducción del parto: 0,16-0,32 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	Inducción del parto: 2- 4 mL/50 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Caballos	Desórdenes inflamatorios: 0,005-0,01 mg/Kg de peso al día, vía I.V. Shock: 4-6 mg/Kg, vía I.V.	Desórdenes inflamatorios: 0,625-1,25 mL/500 Kg al día, vía I.V. Shock: 1 a 1,5 mL/Kg, vía I.V.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en infecciones virales.
- No usar en animales con tuberculosis, nefritis crónica, síndrome de Cushing, úlcera péptica o diabetes (excepto si se usa como terapia de emergencia).
- No usar en animales hipersensibles a la Dexametasona.
- No administrar en hembras gestantes.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos.
- De requerirse un efecto corticoesteroide permanente, la terapia oral es la recomendada.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a Dexametasona.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

EFFECTOS ADVERSOS

Efectos adversos y reacciones adversas:

Puede causar polifagia, poliuria y polidipsia, retrasar la cicatrización de heridas, debilitar la resistencia a infecciones o agravar las ya existentes. En tratamientos prolongados puede causar

hiperadrenocorticismo iatrogénico (Síndrome de Cushing), con pérdida de masa muscular, debilidad, ganancia de peso con redistribución grasa, osteoporosis y úlceras.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos, Ovinos, Cerdos:

- Carne: 5 días.
- Leche: 3 días.

Caballos:

No administrar a caballos cuya carne se destine al consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase utilizar dentro de 4 semanas.

Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N °: 1366
- Uruguay: Reg. N° MGAP A-4495

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico

Veterinario