

HEMODRAG[®] 20 mL - Solución Inyectable

HEMOSTÁTICO Y ANGIOPROTECTOR.



Hemodrag[®] está indicado para la prevención y tratamiento de las hemorragias en cirugía veterinaria, patologías de la reproducción y obstetricia, traumatología accidental y hemorragias localizadas en diversos órganos. Tiene efecto hemostático y angioprotector en procesos dérmicos como petequias, hematomas y heridas.

Hemodrag[®] es eficaz para todos los procesos hemorrágicos cualquiera sea su etiología (a excepción de las hemorragias causadas por agentes cumarínicos), debido a que actúa sobre la hemostasia primaria. Puede ser utilizado en castraciones de caballos y bovinos, corte de cola y castración en cerdos y en hemorragias puerperales en vacas y yeguas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Hemostático y Angioprotector.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:
Etamsilato.....125 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Hemodrag[®] está indicado para la prevención y tratamiento de las hemorragias en cirugía veterinaria, patologías de la reproducción y obstetricia, traumatología accidental y hemorragias localizadas en diversos órganos. Tiene efecto hemostático y angioprotector en procesos dérmicos como petequias, hematomas y heridas.

Hemodrag[®] es eficaz para todos los procesos hemorrágicos cualquiera sea su etiología (a excepción de las hemorragias causadas por agentes cumarínicos), debido a que actúa sobre la hemostasia primaria. Puede ser utilizado en castraciones de caballos y bovinos, corte de cola y castración en cerdos y en hemorragias puerperales en vacas y yeguas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía endovenosa lenta o intramuscular profunda.

Dosis del principio activo:

- Bovinos, caballos y cerdos: 5 a 12,5 mg/Kg de peso, cada seis horas, por 1 a 3 días, según sea necesario.

Dosis del producto:

- Bovinos, caballos y cerdos: 0,4 a 1 mL /10 Kg de peso, cada seis horas, por 1 a 3 días, según sea necesario.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacológicos.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en casos de porfirias aguda, ya que se ha visto que es porfiriogénico en animales.
- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto está indicado para el tratamiento de animales en forma individual. No

tratar a toda la masa de animales.

- Los animales no deben ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento y/o inmediatamente luego de él.
- El producto se oxida en presencia de Oxígeno, por lo cual se debe descartar el volumen remanente después de la administración.
- En el caso de la administración intramuscular, si la dosis requerida es mayor a 20 mL, se sugiere dividirla en dos o más puntos de aplicación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Administrar con precaución. Lavarse las manos después de la aplicación del producto.
- Personas con hipersensibilidad conocida al Etamsilato deben evitar contacto con el medicamento.
- La autoinyección accidental puede provocar alteración de la presión arterial. En caso de ocurrencia, consultar inmediatamente con un médico y mostrar la etiqueta del producto.

EFFECTOS ADVERSOS

No se han descrito.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

OBSERVACIONES

Sobredosis:

Estudios realizados sobre la tolerancia del Etamsilato indican que es bien tolerado incluso en dosis mucho mayores a las recomendadas.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Consérvese a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la

luz.

Una vez abierto el envase utilizar dentro de 1 semana. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 20 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1967

Perú: Reg. SENASA F.F3.01.I.0009

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario